US 11 - Koordinations chemie I

Komplex bildungs gleich gewichte

Komplex bildungs reaktionen können thermodynamisch als Greichgewichts reaktionen betrachtet werden um Konzentrationen von Komplexen vorherzusagen. Komplexe

mit mehrenen gleichen Liganden bilden sich in der Regel sukzessive $Cu^{2t} \xrightarrow{c_1 \Theta} \begin{bmatrix} Cu C_1 \end{bmatrix}^{t} \xrightarrow{c_1 \Theta} \begin{bmatrix} Cu C_1 \end{bmatrix}^{2} \xrightarrow{c_1 \Theta} \begin{bmatrix} Cu C_1 \end{bmatrix}^{2} \xrightarrow{c_1 \Theta} \begin{bmatrix} Cu C_1 \end{bmatrix}^{2}$

Für jeden Schritt können wir eine Gleichgewichtskonstante definieren, die olimensions los ist, auch wenn wir nur Konzentrationen und keine Aktivitäten schreiben. ! K hat keine Einheit!

 $K_{1} = \frac{\left[\left[\operatorname{Cucl}_{2}\right]^{2}\right]}{\left[\operatorname{Cu}^{2}\right]\left[\left[\operatorname{Cu}^{2}\right]\right]} \quad K_{2} = \frac{\left[\operatorname{Cucl}_{2}\right]}{\left[\operatorname{Cucl}_{1}\right]\left[\left[\operatorname{Ci}\right]\right]} \quad K_{3} = \frac{\left[\operatorname{Cucl}_{3}\right]}{\left[\operatorname{Cucl}_{3}\right]\left[\left[\operatorname{Ci}\right]\right]} \quad K_{4} = \frac{\left[\operatorname{Cucl}_{2}\right]}{\left[\operatorname{Cucl}_{3}\right]\left[\left[\operatorname{Ci}\right]\right]}$ Daneben lassen sich Komplexbildungskonstanten B für jede "Ligandenstuse"

definieren, die einfach das Produkt aller Gleichgewichtskonstanten, bis zu dieser Ligandonstude sind. $\beta_{4} = K_{1}$ $\beta_{5} = K_{1} \cdot K_{2} \cdot K_{3}$ $\beta_{4} = \frac{[cuci^{4}]}{[cu^{2}][ci^{7}]}$ $\beta_{5} = \frac{[cuci^{3}]}{[cuci^{3}]}$ $\beta_{5} = \frac{[cuci^{3}]}{[cuci^{3}]}$ $\beta_{5} = \frac{[cuci^{3}]}{[cuci^{3}]}$ β = [cuc|q] | [cuc|q] | β = [cuc|q] |

Die Ligandonstufe mit dem grössten B ist die Stabilste und B ist auch dimensions los ! B hat keine Einheit !

Aus den Bs lassen sich auch die Gleiongewichtskonstanten berechnen:

[cuciz] [cuciz] [cuzi][ci] K2 = [cuci+][ci-] = [cuci+][ci-] · [cu2+][ci-]

 $= \frac{\left[\operatorname{Cucl}_{2}\right] \cdot \left[\operatorname{Cucl}_{2}\right] \cdot \left[\operatorname{Cu$ Erhaltungssätze Analog zu Säure-Base-Araktionen können auch bei Komplexbildungsreaktionen

Massenbilanzen für [M] tot und [1] tot autgestellt werden:

[Cu] tot = [Cu2+] + [cuc1+] + [cuc12] + [cuc13-] + [cuc14-]

 $[CI]_{tot} = [CI^{-}] + [CuCI^{+}] + 2 [CuCI_{2}] + 3 [CuCI_{3}] + 4 [CuCI_{9}^{-}]$

Gileichgewichtskonzentrationen berechnen (Fall: [M] = [L] , B1, B2 >>0) Wit geben gleich viel Metall wie Ligand in lösung, was bedeutet, class nicht genügend Liganden in der Lösung sind, um jedes Metall mehrtach zu Koordinieren. Da abor die Komplexbildungskonstanter grösser als null sind, können wir annehmen, dass so gut wie keine Liganden frei vorliegen. ([1] =0) für die zweite Annahme machen wir ein Gedunkonexponiment. Wir nehmen au, dass die gesamte Menge an M und L zu Beginn vollständig zu ML reagion. Dawn halpen wir nur noch ML in der Läsung. Wenn wir jetzt M ader MLz habon wollen muss folgende Araktion possionen 2 ML = M + ML2 (1) Deswegen was [M]=[ML] gelton, da für jedes entstandone M auch ein ML, entstehen muss. 2 Annahmon: [L] ≈ 0 und [M]=[MLz] $K_1 = \frac{[ML]}{[M][L]} = \beta_1$ $K_2 = \frac{[ML_2]}{[M][L]}$ M = ML = MLz System: B2 = [MLZ] $[M]_{lot} = [M] + [ML] + [ML]$ Erhaltungssätze! [L] + [L] + [M] + Z[ML] = + Z[ML] Für unsere hypothetische Reaktion (1) lässt sich eine Gleichgewichtskonstante außtellen. $2 ML \implies M + ML_2 \implies K = \frac{[M][ML_2]}{[ML]^2} = \frac{[M]}{[ML]} \cdot \frac{[ML_2]}{[ML]} \cdot \frac{[L]}{[L]} = \frac{[M][L]}{[ML]} \cdot \frac{[ML_2]}{[ML]} + \frac{K_2}{K_4}$ $=> K = \frac{K_2}{K_1} = \frac{[M][ML_2]}{[ML]^2} = \frac{[M]^2}{[ML]^2} = \frac{K_2}{K_1} \Rightarrow \sqrt{\frac{K_2}{K_1}} = \frac{[M]}{[ML]} \Rightarrow [M] = [ML] \sqrt{\frac{K_2}{K_1}}$ Nur noch z Unbekannte: In Massembilanz einsetzen: $[M]_{tot} = [M] + [ML] + [ML] = 2[M] + [ML] = 2 \cdot ([ML] \sqrt{\frac{K_2}{K_1}}) + [ML] = [ML] (2(\frac{K_2}{K_1} + 1))$ $[M]_{tot} = [ML] \left(2 \frac{|K_2|}{|K_1|} + 1 \right) = > [ML] = \frac{[M]_{tot}}{2 \frac{|K_2|}{|K_1|} + 1} \frac{1}{2} \frac{|K_1|}{|K_1|} \frac{1}{|K_2|} \frac{1}{|K_$ Detzt kann man [M] in [M] = Z[M] +[ML] = ZML] + [ML] einsetzen und die restlichen Konzentrationen berechnen

Altoric dungs beispiel (WZOZY)

- $\log \beta_1 = \log K_1 = 3.53$ $\log \beta_2 = 6.48 (\log K_2 = 2.95)$ Die Verbindung AqL [5] wird in Wasser gelöst, sodass folglich [L]tot = [Ag]tot = 0.032 M.

Die gemessenen Komplexbildungskonstanten betragen: [4]

Formulieren Sie die sich in dieser Lösung einstellenden Komplexbildungsgleichgewichte mit den entsprechenden Gleichgewichtskonstanten, sowie die Erhaltungssätze für das System L⁻/Ag⁺/AgL/AgL₂⁻. (2 Punkte)

Die deprotonierte Form des Taurins (Tau⁻ = L⁻) bildet mit Ag⁺ in Wasser die Komplexe AgL und AgL₂⁻.

- Hinweis: Protonierungsgleichgewichte von L-dürfen vernachlässigt werden. Ermitteln Sie die Gleichgewichtskonstante für die Reaktion: 2 AgL \Longrightarrow Ag+ + AgL₂
- (2 Punkte) Nennen Sie die Spezies, die in dieser Lösung in mutmasslich vernachlässigbarer Gleichgewichts-
- konzentration vorliegt (im Vergleich zu den übrigen beteiligten Spezies). (1 Punkt) Bestimmen Sie die Gleichgewichtskonzentrationen von Ag⁺, AgL, AgL₂⁻ und L⁻. (3 Punkte)
- $Ag^{+} + L^{-} \rightleftharpoons AgL \qquad k_{A} = \frac{[AgL]}{[Ag][L^{-}]} = B_{1}$ (i) $AgL + L^{-} = AgL_{z}^{-} K_{z} = \frac{[AgL_{z}]}{[AgL][AgL]} = \frac{B_{z}}{B_{1}}$

 - [L] tot = [Ag] + 2 [Ag[] + [L] + [Ht] + [Ht]
- (22)
- [L] ist vernachlässigbar => [AgLz] = [L] = [Ag+][L] [AgLz] = $\frac{K_2}{K_4}$ (iv) $K = \frac{\left[Ag^{\frac{1}{2}}\right]\left[Ag^{\frac{1}{2}}\right]}{\left[Ag^{\frac{1}{2}}\right]^{2}} = \frac{\kappa_{2}}{\kappa_{1}} \implies \frac{\left[Ag^{\frac{1}{2}}\right]}{\left[Ag^{\frac{1}{2}}\right]} = \sqrt{\frac{\kappa_{2}}{\kappa_{1}}} \implies \left[Ag^{\frac{1}{2}}\right] = \left[Ag^{\frac{1}{2}}\right] \times \sqrt{\frac{\kappa_{2}}{\kappa_{1}}}$

[Ag] = [1] = 0.032 M

- [Ag] tot = [Ag+] + [Ag L] + [Ag Lz-] = z[Ag+] + [Ag L] = z ([Ag L] | [Ag L] = [Ag L] (z | [Ag L] + 1)
- => [Agl] = [Ag] (4) = 1.58.10-2 M
 - [Ay] tot = 2[Ag+] + [AyL] => [Ag+] = [AgL_2] = [Ay] tot = [AyL] = 8.10.10-3 M
 - [[] tot = [L] + [AgL] + 2[AyLz] (=> [L] = [L] tot [AgL] 2 [AgLz] = 5.75.10-4 M

Gileichgewichtskonzentrationen berechnen (Fall: [M] (CL] (Sin (Si)

Hier liegen die Liganden im Überschuss vor Um abzuschäften, welcher Komplex am meisten gebildet wird schaut man auf die Komplexbildungskonstanten ß, denn der Komplex mit dem höchsten ß ist der stabilste Komplex Dadurch, dass [L].

der Komplex mit dem höchsten ß ist der Stabilste Komplex Dadurch, dass Illied deutlich größer als [M] tot ist, können wir daven ausgehen, dass fast vollständig nur der stabilste Komplex (hier MLz) in läsung vorkommt. ([M] = [ML] = [ML] = 0)

System: M = ML = MLz = MLs

Erhaltungssätze: $[M]_{tot} = [M] + [ML] + [ML] + [ML] = [ML] = [M]_{tot} = [$

Da wir nun [MLz] und [L] komen können wir das in die Gleichgewichlskonstanton einsetzen, am die übrigen Konzentration zu berochnen.

$$K_{3} = \frac{\lceil M L_{3} \rceil}{\lceil M L_{2} \rceil \lceil L \rceil} = \frac{\lceil M \rceil_{tot}}{\lceil M L_{2} \rceil \lceil L \rceil} \iff \frac{\lceil M L_{2} \rceil}{\lceil M L_{2} \rceil} = \frac{\lceil M \rfloor_{tot}}{\lceil M L_{2} \rceil}$$

$$K_{2} = \frac{\lceil M L_{2} \rceil}{\lceil M L_{2} \rceil} \iff \lceil M L \rceil = \frac{\lceil M L_{2} \rceil}{\lceil M L_{2} \rceil} \iff [L] = \frac{\lceil M L_{2} \rceil}{\lceil M L_{2} \rceil}$$

$$K_{4} = \frac{\lceil M L_{2} \rceil}{\lceil M L_{2} \rceil} \iff [L] = \frac{\lceil M L_{2} \rceil}{\lceil M L_{2} \rceil}$$

Komplexbildungsgleichgewichte und Säure-Bose-Gleichgewicht

Häufig ist der besprochne Ligard in der Komptexbildungsaufgabe bei Togni auch dus zu Beginn besprochene Säuve-Base-System, weswagen Lauch protoniert vorkommen kann. Dies muss in der Massenbilanz von [1] immer aufgeschrieben werden, auch wenn man es häufig vernachlüssigen darf. Falls man das nicht vernachlüssigen darf, muss man wider das Sillen-Dügram.

Fall 1: Extern and geglebenen pH-West groudfort => Im Sillén-Diagramm das Verhältnis

Zwischen [L] und [HL] ablesen und in [L] einsetzen.

Fall z: Selbst gepuffert => Der pH West kann mit der Puffergleichung und dem

geglebenen Verhältnis [HL] berechnet werden: pH = pka(HL+) + lg([L])

Altoristungs beispiel (2021 S)

und Ni(Gg)₃-. Die entsprechenden Komplexbildungskonstanten betragen: • $\log K_1 = 4.14$ • $\log K_2 = 3.30$ • $\log K_3 = 2.64$. ⁵

Eine Lösung wird aus Nickelnitrat (Ni(NO₃)₂) und äquimolaren Anteilen N-Glycylglycin (HGg) und Natrium-N-glycylglycinat (NaGg) zubereitet. Für diese Lösung gilt: • [Ni]tot = 10⁻⁴ M • [Gg]tot = 0.5 M

Ni²⁺ bildet in Wasser mit einfach deprotoniertem N-Glycylglycin (**Gg**⁻) die Komplexe Ni(**Gg**)⁺, Ni(**Gg**)₂

- Formulieren Sie Komplexbildungs-Gleichgewichte und -Konstanten sowie vollständige
- Erhaltungssätze für das System Ni²⁺ / N-Glycylglycin. (2 Punkte) Welche Gleichgewichtskonzentrationen dürfen in den jeweiligen Erhaltungssätzen vernachlässigt
- Ermitteln Sie die Gleichgewichtskonzentrationen der beteiligten Ni-Spezies:6

werden? (1 Punkt)

$$N_i G_{ig}$$
 $+ G_{ig}$ $= N_i G_{ig}$ $+ N_i G_{ig}$ $+ N_i G_{ig}$ $+ N_i G_{ig}$ $+ N_i G_{ig}$

$$[N_i]_{tot} = [N_i^{**}] + [N_i \otimes_g^*] + [N_i \otimes_g^*]$$

$$[Gg]_{tot} = [Gg^{-}] + [NiGg^{+}] + 2[NiGg_{2}] + 3[NiGg_{2}] + [HGg]$$

(ii)

(iii)

$$[NiGg_3^-] = [Ni]_{tot} = 10^{-9} M$$

$$K_3 = \frac{[Ni Gg_3]}{[Ni Gg_2][Gg_2]} \Rightarrow [Ni Gg_2] = \frac{[Ni Gg_3]}{K_3 \cdot \frac{1}{2}[Gg]_{GG}}$$

$$K_2 = \frac{[N:Gg_2]}{[N:Gg_1]} \Rightarrow [N:Gg_1] = \frac{[N:Gg_2]}{K_2 \cdot \frac{1}{2}[Gg_2]_{42}} = 1.8 \cdot 1$$

$$K_{1} = \frac{[N(Gg^{+}]]}{[N(S^{2+}][Gg^{-}]} \Rightarrow [N(S^{2+}]] = \frac{[N(Gg^{+}]]}{K_{1}} = S.3.10^{-13} M$$







dusgehen

Ni Gg-



